


التقديم الآمن في التدخلات التعذوية في ضوء كوفيد-19

لماذا من المهم الاستمرار بالتدخلات التعذوية خلال الوباء؟

الاختلالات في انظمة الغذاء بسبب كوفيد-19 تجعل من الصعب على النساء الحوامل والاطفال في عمر ما قبل المدرسة بالحفاظ على التعذية المناسبة. على كل الاطفال من عمر 6 الى 59 شهر والنساء الحوامل - بما فيهم اولئك المشتبه بإصابتهم او الحالات المؤكدة لـ كوفيد-19 الاستمرار بتلقي خدمات المكملات الغذائية. على أية حال، وبسبب خطورة انتقال كوفيد-19، يجب تعديل الاستراتيجيات والبروتوكولات الادارية الخاصة بالتوزيع للسماح بإجراءات الحماية من العدوى والسيطرة عليها.

التوصيات الاساسية من اجل تقديم خدمة آمنة



التوصيات الرئيسية	الموقع الثابت والتوزيعات الجماعية	توزيع الاسرة
قم بالتوزيع في الهواء الطلق او في مكان جيد التهوية	✓	✓
قم بإرتداء الكمامة، يفضل الكمامة الطبية او N-95؛ اذا لم تتوفر الكمامة الطبية، ارتدي كمامة قماشية.	✓	✓
قم بتبني النساء الحوامل، اولياء الامور وكل الاطفال من عمر 5 سنوات فأكثر بإرتداء الكمامة.	✓	✓
اطلب من جميع الموظفين، النساء الحوامل، اولياء الامور والاطفال بتعقيم الايدي قبل وبعد تقديم الخدمة. يجب ان يتوافر في مكان التوزيع مكان لغسل الايدي او كميات كافية من المعقمات الكحولية.	✓	✓
قم بعمل فحص كوفيد-19 للنساء الحوامل، مقدمي الخدمة، والاطفال وذلك قبل تقديم الخدمة لهم.	✓	✓
ضع في اعتبارك زيادة ايام التوزيع ومواقع التوزيع للتقليل من الازدحام وخطر انتقال العدوى.	✓	
ضع في اعتبارك تنظيم منطقة التجمع الى مجموعات صغيرة. حدد لكل مجموعة ايام معينة للحضور من اجل التوزيع.	✓	
ضع في اعتبارك دمج تقديم مكملات فيتامين أ وطارد الديدان ومكملات المغذيات الدقيقة المتعددة مع التدخلات الأخرى، مثل المناعة ومراقبة النمو أو الزيارات المنتظمة للرعاية السابقة للولادة.	✓	

كيفية الحفاظ على التباعد الجسدي في الازدحام

